

## Original

# Conocimiento sobre los cuidados del recién nacido en el distrito de Pillco Marca, Huánuco, Perú

## *Knowledge about newborn care in the district of Pillco Marca, Huánuco, Peru*

Britney Cespedes Omonte<sup>1a</sup>, Paola Luz Loarte Huaynate<sup>1e</sup>

### Resumen:

**Objetivo:** Determinar el nivel de conocimientos sobre los cuidados del recién nacido en madres primíparas del distrito de Pillco Marca, Huánuco, en 2022. **Metodología:** Se realizó un estudio cuantitativo, descriptivo y transversal en una muestra de 103 madres primíparas que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. La recolección de datos se llevó a cabo mediante un cuestionario sociodemográfico y otro sobre conocimientos del cuidado neonatal, utilizando la técnica de encuesta. El análisis inferencial se efectuó con la prueba Chi Cuadrado y un margen de error de  $p \leq 0.05$ , empleando el software IBM SPSS 25. **Resultados:** Los conocimientos sobre los cuidados del recién nacido fueron evaluados en varias dimensiones. Se obtuvieron resultados estadísticamente significativos en lactancia materna ( $X^2=12.217$ ,  $p=0.000$ ), signos de alarma ( $X^2=81.568$ ,  $p=0.000$ ), control de enfermería ( $X^2=36.381$ ,  $p=0.000$ ) y desarrollo infantil ( $X^2=5.826$ ,  $p=0.016$ ). En otras dimensiones, como el baño del recién nacido, limpieza del cordón umbilical, cambio de pañal y vínculo afectivo, no se encontraron diferencias significativas. **Conclusión:** El 79% de las madres primíparas demostraron un buen nivel de conocimiento sobre los cuidados del recién nacido, lo que indica una adecuada preparación para asumir este rol.

**Palabras Clave:** Conocimiento, madres primíparas, cuidados, recién nacido (Fuente: DECS-BIREME).

### Abstract:

**Objective:** To determine the level of knowledge about newborn care among primiparous mothers in the Pillco Marca district, Huánuco, in 2022. **Methodology:** A quantitative, descriptive, cross-sectional study was conducted with a sample of 103 primiparous mothers who met the inclusion and exclusion criteria. Data collection was carried out using a sociodemographic questionnaire and a questionnaire on newborn care knowledge, with surveys as the technique. Inferential analysis was performed using the Chi-Square test with a significance level of  $p \leq 0.05$ , using IBM SPSS 25 software. **Results:** Knowledge of newborn care was evaluated across several dimensions. Statistically significant results were found in breastfeeding ( $X^2=12.217$ ,  $p=0.000$ ), warning signs ( $X^2=81.568$ ,  $p=0.000$ ), nursing control ( $X^2=36.381$ ,  $p=0.000$ ), and child development ( $X^2=5.826$ ,  $p=0.016$ ). In other areas, such as newborn bathing, umbilical cord cleaning, diaper changing, and emotional bonding, no significant differences were observed. **Conclusion:** 79% of primiparous mothers demonstrated a good level of knowledge about newborn care, indicating adequate preparedness for taking on this responsibility.

**Keywords:** knowledge, first-time mothers, care, newborn (Source: NLM-MeSH).

1. Escuela Académico Profesional de Enfermería, Universidad de Huánuco. Huánuco, Perú
2. Estudiante de Enfermería

Recibido: 03/07/2024

Aprobado: 28/07/2024

### Correspondencia:

Britney Cespedes Omonte

Email: [2019110641@udh.edu.pe](mailto:2019110641@udh.edu.pe)

ORCID: [0000-0003-3757-3550](https://orcid.org/0000-0003-3757-3550)

### Citar como:

Omonte BC, Huaynate PLL. Conocimiento sobre los cuidados del recién nacido en el distrito de Pillco Marca, Huánuco, Perú. Rev Hisp Cienc Salud. 2024; 10(2):69-77. DOI [10.56239/rhcs.2024.102.762](https://doi.org/10.56239/rhcs.2024.102.762)

1. Escuela Académico Profesional de Enfermería, Universidad de Huánuco. Huánuco, Perú
2. Estudiante de Enfermería

**Recibido:** 03/07/2024

**Aprobado:** 28/07/2024

#### **Correspondencia:**

Britney Cespedes Omonte

**Email:** [2019110641@udh.edu.pe](mailto:2019110641@udh.edu.pe)

**ORCID:** [0000-0003-3757-3550](https://orcid.org/0000-0003-3757-3550)

## **Introducción**

El deficiente cuidado del recién nacido implica un alto riesgo de presentar alguna enfermedad e incluso llegar a la muerte. Algunas madres primerizas tienen comportamientos inadecuados con sus hijos recién nacidos, y esto se debe a la falta de conocimiento. Las medidas de higiene son esenciales ya que sin ello el recién nacido puede contraer muchas infecciones cutáneas o bien del sistema genitourinario. Su experiencia escasa o nula, expresa inseguridad o temor y esas reacciones negativas influyen en el desarrollo del recién nacido<sup>1</sup>.

Por ello es muy importante que las madres conozcan a cerca de todos y cada uno de los cuidados del recién nacido, que los practique de forma adecuada y correcta para que así el recién nacido logre un proceso de adaptación de manera satisfactoria<sup>2</sup>.

Existen varios factores que encadenan enfermedades así también la mortalidad y morbilidad neonatal tanto en la comunidad o el hogar, que afectan la subsistencia de los recién nacidos<sup>3</sup>. Estos incluyen el bajo nivel educativo de la madre, la falta de higiene, la falta de atención médica, los malos hábitos alimenticios, el mal cuidado materno, el hecho de que no tenga suficiente información sobre cómo prevenir accidentes y no reconozca los signos y síntomas. Síntomas que puede presentar un recién nacido y luego fallece en su casa sin atención médica profesional que pueda aumentar sus posibilidades de supervivencia<sup>4</sup>.

En Ecuador, 2018, Gaón<sup>5</sup> hallaron que las madres obtuvieron un buen nivel de conocimiento de la higiene, un 87,5%

conocen como cambiar el pañal a su bebé y el 62,5% tienen conocimientos sobre las técnicas. En Brasil, 2017, Tucanes<sup>6</sup> halló que las madres tuvieron un nivel de conocimiento favorable, durante el proceso se percibe ignorancia en: baño, lactancia, higiene del ombligo. En Perú, 2019, Masco<sup>7</sup> encontró que el 79,7% (63) de las madres primerizas tienen conocimientos medios, el 11, conocimientos bajos y el 8,9% (7) conocimientos altos. En Lima, 2020, Ochoa<sup>8</sup> encontró que el 62% de las madres no tenían conocimientos sobre cuidados del recién nacido como: higiene del cordón umbilical y termorregulación. En Huánuco, 2017, Niño<sup>9</sup> halló que el 60% tuvieron buenos conocimientos, el 40% tuvo carencia de conocimientos sobre el cuidado del neonato, respecto a las prácticas, el 64% realizaron buenas prácticas, y el 36% prácticas inapropiadas. En Huánuco, 2016, Hualpa<sup>10</sup> reportó que el conocimiento medio fue 57,9%, y el tipo de conducta ante los cuidados del neonato fue buena en un 93,4%.

El presente trabajo contribuyó a los conocimientos existentes con respecto al cuidado del recién nacido por parte de las madres por primera vez en varios estudios, como la teoría del apego de Bowlby y el cuidado humano de Watson, que han aumentado la importancia del cuidado neonatal adecuado para las madres, profesionales de salud y sociedad en general respecto al desempeño de las primíparas en el cuidado del neonato y así también propició el fortalecimiento del vínculo afectivo madre a recién nacido, para fomentar la sensación de seguridad,

Omonte BC, Huaynate PLL. Conocimiento sobre los cuidados del recién nacido en el distrito de Pilloco Marca, Huánuco, Perú. *Rev Hisp Cienc Salud*. 2024; 10(2):69-77. DOI [10.56239/rhcs.2024.102.762](https://doi.org/10.56239/rhcs.2024.102.762)

#### **Citar como:**

1. Escuela Académico Profesional de Enfermería, Universidad de Huánuco, Huánuco, Perú
2. Estudiante de Enfermería

**Recibido:** 03/07/2024

**Aprobado:** 28/07/2024

#### **Correspondencia:**

Britney Cespedes Omonte

Email: [2019110641@udh.edu.pe](mailto:2019110641@udh.edu.pe)

ORCID: [0000-0003-3757-3550](https://orcid.org/0000-0003-3757-3550)

autoestima y una vida sana. De igual manera se pretendió que la investigación sea una fuente de apoyo a otras investigaciones relacionadas a la temática en estudio. Por tal motivo, el objetivo del estudio fue identificar los conocimientos sobre los cuidados del recién nacido de las madres primíparas en el distrito de Pillco Marca, Huánuco.

#### **Metodología**

##### **Tipo de estudio:**

El enfoque de la investigación fue cuantitativo, de tipo observacional, transversal y prospectivo, con un diseño descriptivo. El estudio se realizó en el ACLAS de Pillco Marca, Huánuco, Perú, entre marzo de 2021 y julio de 2022.

##### **Población y muestra:**

La población estuvo conformada por 140 madres primíparas. La muestra fue probabilística, simple y aleatoria, seleccionándose un total de 103 madres. Se incluyó a todas las madres que asistieron al ACLAS de Pillco Marca y que expresaron voluntariamente su deseo de participar en el estudio. Se excluyó a aquellas madres que no completaron al menos el 80% del cuestionario y a las menores de edad cuyos padres no consintieron su participación.

##### **Instrumentos de recolección de datos:**

Para medir el conocimiento sobre el cuidado del recién nacido, se utilizó el cuestionario de Inga, compuesto por 30 ítems distribuidos en 8 dimensiones: lactancia materna, baño del recién nacido, limpieza del cordón umbilical, cambio de pañal, vínculo afectivo, signos de alarma, control de enfermería y

desarrollo infantil temprano. El conocimiento se categorizó como bueno (21 a 30 puntos), regular (11 a 20 puntos) y deficiente (0 a 10 puntos). El cuestionario fue adaptado y validado en el contexto de las madres del distrito de Pillco Marca mediante una validación cualitativa con la revisión de tres expertos. Además, se evaluó la confiabilidad del instrumento utilizando el coeficiente alfa de Cronbach, obteniendo un valor de 0,725, lo que indica un alto nivel de confiabilidad. También se incluyeron preguntas sociodemográficas para caracterizar a las participantes (edad, estado civil, procedencia, etc.).

##### **Procedimientos de recolección de datos:**

La recolección de datos se realizó entre los meses de septiembre y octubre de 2021, utilizando la técnica de entrevista individual y la encuesta presencial, aplicada durante el control de crecimiento y desarrollo (Cred) del recién nacido. Previamente, se obtuvo el consentimiento informado de las participantes, explicándoles el objetivo y la importancia del estudio.

##### **Análisis de datos:**

Para el análisis descriptivo, se emplearon frecuencias absolutas y porcentajes. En el análisis inferencial, se utilizó la prueba Chi Cuadrado de Pearson, considerando un valor p menor a 0,005. El procesamiento estadístico se realizó con el software SPSS versión 23.0.

##### **Aspectos éticos:**

Se garantizó la confidencialidad de la información conforme a los principios

#### **Citar como:**

Omonte BC, Huaynate PLL. Conocimiento sobre los cuidados del recién nacido en el distrito de Pillco Marca, Huánuco, Perú. Rev Hisp Cienc Salud. 2024; 10(2):69-77. DOI [10.56239/rhcs.2024.102.762](https://doi.org/10.56239/rhcs.2024.102.762)

1. Escuela Académico Profesional de Enfermería, Universidad de Huánuco, Huánuco, Perú
2. Estudiante de Enfermería

Recibido: 03/07/2024

Aprobado: 28/07/2024

**Correspondencia:**

Britney Cespedes Omonte

Email: 2019110641@udh.edu.pe

ORCID: 0000-0003-3757-3550

**Citar como:**

Omonte BC, Huaynate PLL. Conocimiento sobre los cuidados del recién nacido en el distrito de Pillco Marca, Huánuco, Perú. Rev Hisp Cienc Salud. 2024; 10(2):69-77. DOI 10.56239/rhcs.2024.102.762

éticos establecidos en la Declaración de Helsinki. Sólo los investigadores tuvieron acceso a la base de datos. Los participantes no recibieron compensación monetaria. Asimismo, se obtuvo el consentimiento informado de todas las madres, quienes firmaron su aceptación antes de participar.

**Resultados**

Al analizar las características sociodemográficas de madres primíparas en estudio, se halló que el 75,7 % (78) de las madres fueron jóvenes, así mismo, en cuanto respecta al estado civil predominó que el 65,0 % (67) fueron solteras, cuya procedencia fue 59,2 % (61) del área urbana y Finalmente, el grado de instrucción en predominio fue del nivel secundario con un 88,3 % (91) (Ver tabla 1).

**Tabla 1.** Características sociodemográficas de madres primíparas en el distrito de Pillco Marca, Huánuco – 2022.

Características sociodemográficas	n=103	
	fi	%
<b>Edad de la madre</b>		
Adolescente (14 a 17)	09	08,7
Joven (18 a 29)	78	75,7
Adulto (30 a 35)	16	15,6
<b>Estado Civil</b>		
Soltera	67	65,0
Casada	02	1,9
Conviviente	34	33,0
<b>Procedencia</b>		
Urbana	61	59,2
Rural	42	40,8
<b>Grado de instrucción</b>		
Primaria	03	2,9
Secundaria	91	88,3
Superior no universitario	07	6,8
Superior Universitario	02	1,9
<b>TOTAL</b>	<b>103</b>	<b>100,0</b>

En las características demográficas se evidenció que el 30,1% (31) de recién nacidos se encuentran entre las edades

de 11 a 15 días, así mismo, con respecto al sexo predominó el 53,4% (55) que fueron femeninos (Ver tabla 2).

**Tabla 2.** Características demográficas del recién nacido en el distrito de Pillco Marca, Huánuco – 2022.

Características demográficas	n=103	
	fi	%
<b>Edad del bebé</b>		
1 a 5 días	24	23,2
6 a 10 días	28	27,1
11 a 15 días	31	30,1
16 a 28 días	20	19,4
<b>Sexo del bebé</b>		
Masculino	48	46,6
Femenino	55	53,4
<b>TOTAL</b>	<b>103</b>	<b>100,0</b>

Se evidenció que el mayor porcentaje en el nivel de conocimiento sobre la lactancia fue bueno con un 85,4% (88), de igual manera en el baño del recién nacido con 82,5% (85), vínculo afectivo con 95,1% (98) y desarrollo infantil temprano con un nivel de conocimiento bueno de 75,7% (78). Así mismo, el mínimo porcentaje de madres obtuvieron conocimientos deficientes en limpieza del cordón umbilical con 7,8% (08), del mismo modo en el cambio de pañal con nivel de conocimiento deficiente de 1,0% (01), signos de alarma con un 4,9% (05) y por último, el porcentaje mínimo en el control de enfermería fue de conocimiento deficiente de 5,8% (06). En la tabla 4, se puede apreciar de las madres primíparas 100% (103) evaluadas sobre conocimiento sobre cuidados del recién nacido, de los cuales 17,3% (17) tuvieron conocimiento regular, 80,3 (83) conocimiento bueno y 2,4 (03) conocimiento deficiente (Ver tabla 3).

1. Escuela Académico Profesional de Enfermería, Universidad de Huánuco, Huánuco, Perú
2. Estudiante de Enfermería

Recibido: 03/07/2024

Aprobado: 28/07/2024

#### Correspondencia:

Britney Cespedes Omonte

Email: 2019110641@udh.edu.pe

ORCID: 0000-0003-3757-3550

#### Citar como:

Omonte BC, Huaynate PLL. Conocimiento sobre los cuidados del recién nacido en el distrito de Pillco Marca, Huánuco, Perú. Rev Hisp Cienc Salud. 2024; 10(2):69-77. DOI 10.56239/rhcs.2024.102.762

**Tabla 3.** Conocimientos de los cuidados del recién nacido por dimensiones de las madres primíparas. Distrito de Pillco Marca, Huánuco – 2022.

Dimensiones de los conocimientos	n=103	
	fi	%
<b>Lactancia materna</b>		
Bueno	88	85,4
Regular	15	14,6
<b>Baño del recién nacido</b>		
Bueno	85	82,5
Regular	18	17,5
<b>Limpieza del cordón umbilical</b>		
Bueno	63	61,2
Regular	32	31,1
Deficiente	08	7,8
<b>Cambio de pañal</b>		
Bueno	95	92,2
Regular	07	6,8
Deficiente	01	1,0
<b>Vínculo afectivo</b>		
Bueno	98	95,1
Regular	05	4,9
<b>Signos de alarma</b>		
Bueno	80	77,7
Regular	18	17,5
Deficiente	05	4,9
<b>Control de enfermería</b>		
Bueno	75	72,8
Regular	22	21,4
Deficiente	06	5,8
<b>Desarrollo infantil temprano</b>		
Bueno	78	75,7
Regular	25	24,3
<b>Nivel de conocimientos global</b>		
Bueno	83	80,3
Regular	17	17,3
Deficiente	03	2,4
Bueno	83	80,3

#### Resultados Inferenciales

Se evaluó la relación entre el nivel de conocimiento de las madres sobre los cuidados del recién nacido y diversas dimensiones específicas. En cuanto a la lactancia materna, el 84,5% (n=87) de las madres demostraron tener un buen nivel de conocimiento, con una significancia estadística [ $X^2=12,217$ ,  $gl=1$ ,  $p=0,000$ ], lo que permite rechazar la hipótesis nula. En la dimensión de baño del recién nacido, el 80,6% (n=83) de las madres presentaron un buen nivel de conocimiento, aunque la significancia estadística no fue concluyente [ $X^2=3,053$ ,  $gl=1$ ,  $p=0,081$ ], aceptándose la hipótesis alterna.

Respecto a la limpieza del cordón umbilical, el

60,2% (n=62) de las madres mostraron buenos conocimientos; sin embargo, no se halló una asociación estadísticamente significativa [ $X^2=2,961$ ,  $gl=2$ ,  $p=0,227$ ], por lo que se acepta la hipótesis alterna. En cuanto al cambio de pañal, el 89,3% (n=92) de las madres demostraron tener un buen nivel de conocimiento, sin una significancia estadística relevante [ $X^2=2,204$ ,  $gl=2$ ,  $p=0,332$ ], aceptándose la hipótesis alterna.

En lo referente al vínculo afectivo, el 91,3% (n=94) de las madres mostró buenos conocimientos, sin significancia estadística [ $X^2=0,212$ ,  $gl=1$ ,  $p=0,645$ ], por lo que se acepta la hipótesis alterna. En la dimensión de signos de alarma, el 77,7% (n=80) de las madres presentaron buenos conocimientos, con una alta significancia estadística [ $X^2=81,568$ ,  $gl=2$ ,  $p=0,000$ ], lo que lleva a rechazar la hipótesis nula.

En relación con el control de enfermería, el 71,8% (n=74) de las madres mostró buenos conocimientos, con significancia estadística [ $X^2=36,381$ ,  $gl=2$ ,  $p=0,000$ ], rechazándose la hipótesis nula. Finalmente, en la dimensión de desarrollo infantil, el 74,7% (n=94) de las madres demostró buenos conocimientos, con una significancia estadística [ $X^2=5,826$ ,  $gl=1$ ,  $p=0,016$ ], aceptándose la hipótesis alterna.

#### Discusión

En el estudio se halló que el nivel de conocimiento en la dimensión lactancia materna de las madres primíparas fue bueno y significativo.

Según la teoría del modelo de rol materno de rango medio en la alimentación infantil, a través del método de derivación de la teoría de Fawcett. Este modelo tiene como objetivo explicar cómo las características maternas e infantiles influyen en el papel de la alimentación en

1. Escuela Académico Profesional de Enfermería, Universidad de Huánuco, Huánuco, Perú
2. Estudiante de Enfermería

**Recibido:** 03/07/2024

**Aprobado:** 28/07/2024

**Correspondencia:**

Britney Cespedes Omonte

Email: [2019110641@udh.edu.pe](mailto:2019110641@udh.edu.pe)

ORCID: [0000-0003-3757-3550](https://orcid.org/0000-0003-3757-3550)

el estado nutricional de la madre y el niño durante el primer año de vida. A través de este modelo, se brinda soporte teórico para investigaciones e intervenciones de enfermería dirigidas a la prevención de problemas de alimentación en los bebés<sup>3</sup>.

En la misma línea, Bermeo y Crespo<sup>12</sup> obtuvieron similares resultados con la presente investigación: 84.93% de las madres conocen sobre la alimentación del recién nacido. Así mismo, concuerda con el de Inga<sup>11</sup> donde refiere que un 80% conocen el tema, Suárez<sup>13</sup> y Castro<sup>14</sup> quien obtuvo un conocimiento bueno de 85%. Estos resultados difieren con el de Masco<sup>7</sup> que encontró un predominio de conocimiento medio [62% (49)], y de alto con 26.6% (21). Así también difieren con el de Monzón<sup>15</sup> y Pino<sup>16</sup> respecto a los ítems de alimentación con un 56.67% respectivamente y del mismo modo con el de Ascona<sup>17</sup>, quien obtuvo 55.4% de las madres primíparas tienen un nivel deficiente sobre lactancia materna.

Asimismo, se halló de forma significativa que el nivel de conocimiento en la dimensión signos de alarma fue bueno<sup>18</sup>. Aplicando la teoría y el enfoque de Henderson al cuidado avanzado de enfermería en pediatría, según esta teoría, el cuidado de enfermería debe enfocarse en las necesidades de las personas sanas o enfermas, en la familia o la comunidad, utilizando una forma sistemática de trabajo como el proceso de enfermería. Para ella, existen 14 necesidades humanas básicas que guían las cinco fases del proceso<sup>19,20</sup>.

Estos hallazgos son similares a los resultados de Inga<sup>11</sup> quien refiere que el 86% (14) conocen sobre los signos de alarma, así mismo, Tananta<sup>20</sup> y Montoro<sup>21</sup> encuentra que más del 70% tienen un nivel de conocimiento alto sobre el tema, Aguirre<sup>22</sup> y Tananta<sup>23</sup> encuentra que el 76% de las madres tienen un conocimiento alto sobre los signos de alarma. Estos resultados difieren con Masco<sup>7</sup> con un 44.63% que presentan conocimiento medio, así también difieren con el de Castro<sup>14</sup> donde resalta el conocimiento bajo con 80% y Bermeo<sup>12</sup> con un 40% de las madres tienen un nivel alto en el área de signos de alarma.

Finalmente se halló que el nivel de conocimientos en la dimensión control de enfermería fue bueno y significativo. Según la teoría del Dr. Orem, el objetivo de la enfermería es: "Ayudar al individuo a lograr y mantener medidas de autocuidado para mantener la salud y la vida, recuperarse de la enfermedad y/o afrontar las consecuencias de dicha enfermedad. También establece que las enfermeras pueden usar cinco formas de ayudar, trabajando, llenando vacíos, asesorando, educando, apoyando y proporcionando un entorno para el crecimiento<sup>20,21</sup>. Estos hallazgos son similares a los de Montoro<sup>22</sup> y Aguirre<sup>23</sup> y respecto al control de enfermería que predominó un conocimiento bueno de 75%, así mismo concuerda con el de Avalos<sup>24</sup> donde refiere que un 72.1% conocen el tema y Fernandez<sup>25</sup> y Torres<sup>26</sup> quien obtuvo que el 74% presentan conocimientos altos.

Omote BC, Huaynate PLL. Conocimiento sobre los cuidados del recién nacido en el distrito de Pilloco Marca, Huánuco, Perú. *Rev Hisp Cienc Salud*. 2024; 10(2):69-77. DOI [10.56239/rhcs.2024.102.762](https://doi.org/10.56239/rhcs.2024.102.762)

**Citar como:**

1. Escuela Académico Profesional de Enfermería, Universidad de Huánuco, Huánuco, Perú
2. Estudiante de Enfermería

**Recibido:** 03/07/2024

**Aprobado:** 28/07/2024

#### Correspondencia:

Britney Cespedes Omonte

Email: [2019110641@udh.edu.pe](mailto:2019110641@udh.edu.pe)

ORCID: [0000-0003-3757-3550](https://orcid.org/0000-0003-3757-3550)

Estos resultados difieren con el de Rios<sup>27</sup> que en su estudio se observó que presentan conocimientos buenos con un 14.8%. Así también difieren con el de Perez<sup>28</sup> que encuentra que el 46% de madres tienen conocimientos buenos y Chicaiza<sup>29</sup> y Huillcas<sup>30</sup> quien obtiene que el 54.2% conocen sobre los ítems de control de enfermería.

Las limitaciones que se identificó en esta investigación están relacionadas a las madres primíparas, puesto que en muchos casos, no aceptaron participar porque no disponían de suficiente tiempo por motivos laborales domésticas; se previó que las madres no respondieron la encuesta seriamente ya que no estaban en constante supervisión, algunas madres primerizas no acudieron al Centro de Salud de Pillco Marca, por tal motivo se tuvo que realizar visitas domiciliarias, por otra parte, no se presentó más limitaciones en el estudio, porque se contó con los recursos materiales y logísticos necesarios para ejecutar la investigación.

Los resultados sugieren que las madres primíparas del distrito de Pillco Marca poseen, en su mayoría, un buen nivel de conocimiento sobre los cuidados del recién nacido, especialmente en las áreas de lactancia materna, signos de alarma y control de enfermería. No obstante, persisten oportunidades de mejora en otras dimensiones, como el baño del recién nacido y la limpieza del cordón umbilical, lo que justifica la necesidad de reforzar las estrategias educativas en estos temas. Estos hallazgos proporcionan una base sólida para futuras

intervenciones de enfermería y programas de salud pública orientados a mejorar el autocuidado y la prevención de complicaciones en el recién nacido.

#### Financiamiento

Autofinanciado

#### Conflictos de interés

Los autores niegan tener conflictos de interés.

#### Referencias Bibliográficas

1. López-Candiani C. Cuidados del recién nacido saludable. Acta Pediatr [Internet]. 2016 [citado 6 de julio de 2023];35(6):1-8. Disponible en: [http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0186-23912014000600010](http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0186-23912014000600010)
2. Mijares C. Cuidados del recién nacido en el hogar. Prioridad de la enfermera en la postmodernidad. Port Med [Internet]. 2017 [citado 6 de julio de 2023];5(10):1-8. Disponible en: <https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articulos/3969/3/Cuidados-del-recien-nacido-en-el-hogar.-Prioridad-de-la-enfermera-en-la-post-modernidad>
3. Blasco Navarro M, Cruz Cobas M, et al. Principales factores de riesgo de la morbilidad y mortalidad neonatales. Medisan [Internet]. 2018 [citado 6 de julio de 2023];22(7):1-22. Disponible en: <http://scielo.sld.cu/pdf/san/v22n7/1029-3019-san-22-07-578.pdfhttps://doi.org/10.30554/archmed.18.2.2734.2018>
4. Delgado Piloso M, Chusino Alarcón E, Bravo Cevallos. Nivel de conocimiento de higiene oral de las madres y su influencia en la salud bucodental menores 0-3 años. Rev Public [Internet]. 2016 [citado 8 de julio de 2023];3(7):1-8. Disponible en: [https://revistapublicando.org/revista/index.php/crv/article/view/111/pdf\\_118](https://revistapublicando.org/revista/index.php/crv/article/view/111/pdf_118)

Omonte BC, Huaynate PLL. Conocimiento sobre los cuidados del recién nacido en el distrito de Pillco Marca, Huánuco, Perú. Rev Hisp Cienc Salud. 2024; 10(2):69-77. DOI [10.56239/rhcs.2024.102.762](https://doi.org/10.56239/rhcs.2024.102.762)

#### Citar como:

1. Escuela Académico Profesional de Enfermería, Universidad de Huánuco. Huánuco, Perú
2. Estudiante de Enfermería

**Recibido:** 03/07/2024

**Aprobado:** 28/07/2024

**Correspondencia:**

Britney Cespedes Omonte

Email: [2019110641@udh.edu.pe](mailto:2019110641@udh.edu.pe)

ORCID: [0000-0003-3757-3550](https://orcid.org/0000-0003-3757-3550)

**Citar como:**

Omonte BC, Huaynate PLL. Conocimiento sobre los cuidados del recién nacido en el distrito de Pillco Marca, Huánuco, Perú. *Rev Hisp Cienc Salud*. 2024; 10(2):69-77. DOI [10.56239/rhcs.2024.102.762](https://doi.org/10.56239/rhcs.2024.102.762)

5. Gaón Yandún DM. Nivel de conocimiento de las madres primigestas en el cuidado del recién nacido con enfoque intercultural en el cantón Cotacachi 2018 [Internet] [Tesis para optar el título profesional de Licenciada en Enfermería]. [Ecuador]: Universidad Técnica del Norte; 2018 [citado 18 de febrero de 2023]. Disponible en: <http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/7962>
6. Tucanes Almeida VM. Conocimientos, actitudes y prácticas en el cuidado del recién nacido en madres primerizas Hospital San Luis de Otavalo [Internet] [Tesis para optar el título en Enfermería]. [Ecuador]: Universidad Técnica del Norte; 2017 [citado 8 de julio de 2023]. Disponible en: <http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/7349>
7. Masco Layme AB. Conocimiento de madres primíparas sobre cuidados básicos del recién nacido, Hospital Nacional Arzobispo Loayza [Internet] [Tesis para optar el título profesional de Licenciada en Enfermería]. [Lima]: Universidad Nacional Federico Villarreal; 2020 [citado 8 de julio de 2023]. Disponible en: <https://hdl.handle.net/20.500.13084/4251>
8. Ochoa Condori P. Conocimientos de las madres primíparas sobre los cuidados del recién nacido en el Centro de Salud Infantil Manuel Barreto, San Juan de Miraflores, 2020 [Internet] [Tesis para optar el título de especialista en Enfermería en Salud y Desarrollo Integral]. [Lima]: Universidad Privada Norbert Wiener; 2020 [citado 8 de julio de 2023]. Disponible en: <https://hdl.handle.net/20.500.13053/4458>
9. Niño Córdova LA. Conocimientos y prácticas sobre el cuidado de los recién nacidos en madres adolescentes que acuden al Centro de Salud de Pillco Marca, Huánuco [Internet] [Tesis para optar el título en Enfermería]. [Huánuco]: Universidad de Huánuco; 2017 [citado 8 de julio de 2023]. Disponible en: <http://repositorio.udh.edu.pe/123456789/626>
10. Hualpa Vítor SL. Conocimiento y conductas de cuidados básicos al recién nacido por madres adolescentes, usuarias del Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano de Huánuco, 2016 [Internet] [Tesis para optar el título profesional de Licenciada en Enfermería]. [Huánuco]: Universidad de Huánuco; 2016 [citado 8 de julio de 2023]. Disponible en: <http://repositorio.udh.edu.pe/123456789/207>
11. Inga Castro EG. Conocimientos de las madres primíparas sobre los cuidados del recién nacido en el hogar del servicio de alojamiento conjunto del Centro Materno Infantil Daniel Alcides Carrión [Internet] [Tesis para optar el título de Especialista en Enfermería Neonatología]. [Lima]: Universidad Mayor de San Marcos; 2016 [citado 8 de julio de 2023]. Disponible en: <https://hdl.handle.net/20.500.12672/5952>
12. Bermeo Calle J, Crespo Calle A. Determinación del nivel de conocimiento sobre el cuidado del recién nacido en madres adolescentes primíparas que alumbran en el Hospital Regional Vicente Corral Moscoso [Internet] [Tesis para optar el título de licenciadas en Estimulación Temprana en Salud]. [Ecuador]: Universidad de Cuenca; 2016 [citado 8 de julio de 2023]. Disponible en: <http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/24444>
13. Suárez Quingaluisa A. Educación por parte del personal de enfermería en el cuidado del recién nacido en relación con el grado de conocimientos adquiridos por madres primíparas al momento del alta en el servicio de maternidad del Hospital Provincial General de Latacunga [Internet] [Tesis para optar el título profesional de

1. Escuela Académico Profesional de Enfermería, Universidad de Huánuco. Huánuco, Perú
2. Estudiante de Enfermería

**Recibido:** 03/07/2024

**Aprobado:** 28/07/2024

**Correspondencia:**

Britney Cespedes Omonte

Email: [2019110641@udh.edu.pe](mailto:2019110641@udh.edu.pe)

ORCID: [0000-0003-3757-3550](https://orcid.org/0000-0003-3757-3550)

**Citar como:**

Omonte BC, Huaynate PLL. Conocimiento sobre los cuidados del recién nacido en el distrito de Pilloco Marca, Huánuco, Perú. *Rev Hisp Cienc Salud*. 2024; 10(2):69-77. DOI [10.56239/rhcs.2024.102.762](https://doi.org/10.56239/rhcs.2024.102.762)

- Licenciada en Enfermería]. [Ecuador]: Universidad Técnica de Ambato; 2016 [citado 8 de julio de 2023]. Disponible en: <http://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/8340>
14. Castro Yar E. Conocimientos sobre cuidados básicos del recién nacido en madres adolescentes ingresadas en el servicio de gineco-obstetricia del Hospital General Puyo [Internet] [Tesis para optar el título de Licenciada en Enfermería]. [Ecuador]: Universidad Nacional de Loja; 2016 [citado 8 de julio de 2023]. Disponible en: <http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/9252>
  15. Monzón Gonzales MY. Conocimiento de madres primíparas sobre lactancia materna y factores sociodemográficos-culturales en el Centro de Salud Perinatal Baños del Inca, Cajamarca [Internet] [Tesis para optar el título profesional de Licenciada en Enfermería]. [Cajamarca]: Universidad Nacional de Cajamarca; 2017 [citado 8 de julio de 2023]. Disponible en: <https://repositorio.unc.edu.pe/handle/20.500.14074/1808>
  16. Pino Armijo P. Aplicación de la teoría de Henderson y su aproximación al cuidado avanzado en enfermería en un servicio de pediatría. *Medwave* [Internet]. 2016 [citado 6 de julio de 2023];12(10):1-7. Disponible en: <https://www.medwave.cl/link.cgi/Medwave/Revisiones/Análisis/5548>
  17. Ascona Trujillo LM. Nivel de conocimientos de las madres primerizas sobre el cuidado del recién nacido en un hospital de salud [Internet] [Tesis para optar el título profesional de Licenciada en Enfermería]. [Lima]: Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 2017 [citado 11 de julio de 2023]. Disponible en: <https://hdl.handle.net/20.500.12672/6797>
  18. Acosta D. Nivel de conocimiento de madres primigestas en el cuidado del recién nacido del Centro de Salud Santa María del Valle, Huánuco, 2016 [Internet] [Tesis para optar el título de Especialista en Cuidados Intensivos Neonatales]. [Huánuco]: Universidad Nacional Hermilio Valdizán; 2016 [citado 11 de julio de 2023]. Disponible en: <https://hdl.handle.net/20.500.13080/2276>
  19. Tizón Bouza E, Marcos Espino P. Aplicación del modelo de Dorothea Orem ante un caso de una persona con dolor neoplásico. *Gerokomos* [Internet]. 2016 [citado 6 de julio de 2023];24(4):1-7. Disponible en: [https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1134-928X2013000400005](https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1134-928X2013000400005)
  20. Tananta Saboya G. Nivel de conocimiento y prácticas del cuidado al recién nacido en madres del distrito de Iquitos, Loreto 2020 [Internet] [Tesis para optar el título profesional de Licenciada en Enfermería]. [Iquitos]: Universidad Privada de la Selva Peruana; 2020 [citado 16 de febrero de 2024]. Disponible en: <http://repositorio.ups.edu.pe/handle/UPS/99>
  21. Pérez Correa JR, Ponce Valles JJ. Conocimiento sobre el cuidado del cordón umbilical del neonato y su relación con la práctica [Internet] [Tesis para optar el título profesional de Licenciada en Enfermería]. [Tarapoto]: Universidad Nacional de San Martín; 2016 [citado 16 de febrero de 2024]. Disponible en: <http://hdl.handle.net/11458/2483>

